

## **Vyjádření výboru České CLL skupiny, sekce České hematologické společnosti ČLS JEP, k očkování proti viru SARS-CoV-2 (onemocnění COVID-19) u nemocných s chronickou lymfocytární leukemií**

Nemocní s chronickou lymfocytární leukemií (CLL), ať již léčeni či neléčeni, jsou v důsledku komplexní imunosuprese jednoznačně rizikovou skupinou ve vztahu k morbiditě a mortalitě spojené s onemocněním COVID-19, tedy infekcí virem SARS-CoV-2. COVID-19 má u nemocných s CLL průběh často závažnější, než je tomu u osob bez CLL.

Výbor ČSCLL proto vydává toto stanovisko k očkování nemocných s CLL proti COVID-19:

- Očkování je u nemocných s CLL obecně doporučeno; výhody vakcinace převažují nad eventuálními nevýhodami.
- Vakcíny proti SARS-CoV-2 neobsahují živý virus, není tedy riziko přenosu infekce očkováním.
- Očkovat se mohou nemocní s CLL bez terapie, ale i pacienti dlouhodobě léčeni ibrutinibem či dalšími cílenými inhibitory (venetoklax, idelalisib apod.), či nemocní na dlouhodobé paliativní chemoterapii (např. chlorambucil).
- Výjimku tvoří nemocní léčení v předešlých 6 měsících anti-CD20 protilátkou (rituximab, obinutuzumab), ať již v rámci chemoimunoterapie, kombinace s cíleným inhibitorem, či monoterapií. Tito nemocní by měli být očkováni až po uplynutí 6 měsíců od poslední dávky anti-CD20 protilátky, jinak je minimální šance na vytvoření dostatečné imunitní odpovědi na očkování vzhledem k závažné depleci normálních B-lymfocytů anti-CD20 protilátkou.
- Není třeba preferovat žádnou z dostupných a připravovaných vakcín.
- Je třeba se dále řídit obecnými kontraindikacemi očkování; při nejistotě stran vhodnosti očkování je vhodné konzultovat se specializovaným hematologickým centrem.

Pro další informace viz [www.cll.cz](http://www.cll.cz)

5. 1. 2021, výbor ČSCLL